

Frage 1: Wann und mit welchen Beschwerdebildern kommen Männer / Frauen zum Arzt?

Quote der festgestellten Krampfadererkrankungen insgesamt (Männer♂ und Frauen♀)

Männer	20%
Frauen	37%

Quote der bei der Untersuchung festgestellten Unterschenkelekzeme

Männer	7,5%
Frauen	7,5%

Quote der bei der Untersuchung festgestellten „Ulcera cruris venosum“ (offene Beine)

Männer	0,3%
Frauen	0,2%

Frage 2: Welche Bedeutung messen Männer / Frauen Veränderungen an ihren Beinen bei?

Veränderungen ernst genommen und gehandelt	♂ 49% ♀ 91%
Veränderungen haben mich nicht gestört	♂ 21% ♀ ≤5%
Veränderungen als unbedeutend abgetan	♂ 20% ♀ ≤5%
Veränderungen überhaupt nicht selbst bemerkt	♂ 12% ♀ 0%

Frage 3: Was ist die Motivation der Männer / Frauen, in die Sprechstunde zu kommen?

Ich habe aktuell Beschwerden	♂ 23% ♀ 76%
Meine Frau / Partner schickt mich	♂ 58% ♀ 0%
Mein ästhetisches Empfinden	♂ 17% ♀ 100%

Frage 4: In welchem Stadium der Krampfadererkrankung kommen Männer / Frauen erstmals zum Arzt?

Besenreiser, geschwollene Beine	♂ 11% ♀ 74%
Sichtbare Krampfadern	♂ 69% ♀ 20%
Hautveränderungen	♂ 18% ♀ 75%

Frage 5: Welche Gründe hindern speziell Männer, mit Krampfadern zum Facharzt zu gehen?

Habe erst nichts von der Erkrankung gemerkt	♂ 32%
Habe die Veränderungen nicht ernst genommen	♂ 31%
Angst vor einem Arztbesuch	♂ 19%
Sonstige Gründe	♂ 24%

Frage 6: Welchen Stellenwert haben Krampfadern für Männer und unterscheidet sich dieses von dem bei Frauen?

Krampfadern stören mein ästhetisches Empfinden

♂ 18% ♀ 91%

Krampfadern sind für mich eine ernst zu nehmende Erkrankung

♂ 9% ♀ 53%

Frage 7: Wie hoch ist bei Männern / Frauen die Akzeptanz der invasiven Behandlungsmaßnahmen und gibt es diesbezüglich Präferenzen?

Lehnt eine Behandlung kategorisch ab	♂ 5%	♀ 0%
Zögert Behandlung hinaus	♂ 44%	♀ 27%
Wünscht Behandlung mit High-Tech-Verfahren	♂ 51%	♀ 39%

Frage 8: Wie hoch ist die generelle Bereitschaft sich behandeln zu lassen?

♂ 51% ♀ 79%

Frage 9: Therapietreue / Compliance – Wie werden verordnete Vorbeugemaßnahmen genutzt / umgesetzt?

Rezepteinlösung für Kompressionsstrümpfe ♂ 49% ♀ 89%

Frage 10: Wie viele Männer / Frauen entscheiden sich zu der invasiven Behandlung eines bei der Untersuchung festgestellten Venenleidens?

♂ 30% ♀ 62%

Frage 11: Welche „Männergruppe“ erscheint besonders anfällig und gefährdet bzgl. des Entstehens von Krampfadern und deren Folgen?

- Erbliche Vorbelastung
- Vielflieger, Autofahrer, Vielsitzer
- Stehberufe