



Auch das Nagelbett muss ausreichend mit Händedesinfektionsmittel benetzt und eingerieben werden.



Vergessen Sie nicht, das Mittel über das Handgelenk hinaus zu verteilen und beachten Sie, dass Sie sich insgesamt knapp 30 Sekunden die Hände desinfizieren sollten. Reiben Sie das Desinfektionsmittel ein, bis Ihre Haut trocken ist. Auf diese Weise vermeiden Sie, dass die Haut durch die Desinfektion an Feuchtigkeit verliert.

KSH 9001188/10.17

Bitte beachten Sie:

Händedesinfektionsmittel sind auf alkoholischer Basis und sollten nicht in die Augen gelangen.
Bitte beaufsichtigen Sie Kinder bei der Anwendung.

Der vorliegende Text wurde auf Basis aktueller Empfehlungen des Robert Koch-Institutes (RKI) in Berlin erstellt (www.rki.de).


Kontakt

Robert-Bosch-Krankenhaus
Standort Klinik Schillerhöhe
Abteilung für Labormedizin
Krankenhaushygiene
Telefon 07156/203-7266

Robert-Bosch-Krankenhaus
Standort Klinik Schillerhöhe
Solitudestraße 18, 70839 Gerlingen
info@klinik-schillerhoehe.de
www.klinik-schillerhoehe.de

Ein Unternehmen der Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH

Informationen für Patienten und Angehörige Händedesinfektion



Robert-Bosch-Krankenhaus
Klinik Schillerhöhe

Liebe Patienten, liebe Angehörige,
liebe Besucher,
Krankheitserreger werden oftmals über
die Hände übertragen. Durch regelmä-
ßiges Händewaschen und die richtige
Desinfektion können viele Infektionen
bereits im Vorfeld vermieden werden.

Das Robert-Bosch-Krankenhaus stellt
Ihnen dafür Spender mit Händedesin-
fektionsmitteln, beispielsweise in den
Wartebereichen, auf den Toiletten sowie
vor bzw. in den Patientenzimmern, zur
Verfügung

In diesem Falblatt möchten wir Sie
über den richtigen Umgang mit dem
Desinfektionsmittel informieren.
Darüber hinaus stehen Ihnen unsere
Hygienefachkräfte als Ansprechpartner
jederzeit zur Verfügung.

Prof. Dr. med.
Mark Dominik Alscher
Geschäftsführender
Ärztlicher Direktor

Prof. Dr. med.
Michael Torzewski
Krankenhaushygieniker



1

Entnehmen Sie eine ausreichende Menge Händedesinfektionsmittel, bis ein kleiner See in der hohlen Hand entsteht (ca. zwei bis drei Mal pumpen).



3

Vergessen Sie nicht, auch die Fingerkuppen, mit dem Desinfektionsmittel einzureiben.



2

Verteilen Sie das Händedesinfektionsmittel, indem Sie es auf den Handflächen sowie über Hand- und Daumenrücken verreiben.



4

Alle Finger und Fingerzwischenräume müssen sorgfältig behandelt werden.